

Übersicht der Gesetzlichen Vorsorgeleistungen in unserer Praxis



Alter	Geschlecht	Wie oft	Untersuchung	Was wird gemacht
Ab 18 Jahren	M+W	Einmalig im Alter von 18 bis 35 Jahren	Check-up: Früherkennung u.a. von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) ✓ körperliche Untersuchung ✓ Beratung zum Untersuchungsergebnis ✓ Blutuntersuchung nur bei Risikofaktoren nach Absprache
Ab 35 Jahren	M+W	Alle 3 Jahre	Check-up: Früherkennung u.a. von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) ✓ körperliche Untersuchung ✓ Kontrolle der Blutfettwerte und des Blutzuckers ✓ Kontrolle des Urins ✓ Ab 50 zusätzlich EKG, Nieren- und Leberwerte, Harnsäure, kleines Blutbild ✓ einmalig: Blutuntersuchung auf die Leberentzündungen Hepatitis B und C ✓ Weitere Laboruntersuchungen sind nach vorheriger Absprache mit der Ärztin als Selbstzahlerleistung möglich ✓ Beratung zum Untersuchungsergebnis
	M+W	Alle 2 Jahre	Früherkennung Hautkrebs	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) ✓ Untersuchung der gesamten Haut ✓ Beratung zum Untersuchungsergebnis
Ab 45 Jahren	Nur M	1x im Jahr	Früherkennung Krebserkrankungen der Prostata und des äußeren Genitales	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten) ✓ Inspektion und Abtasten der äußeren Geschlechtsorgane ✓ Enddarmaustastung zur Untersuchung der Prostata ✓ Untersuchung örtlicher Lymphknoten ✓ Beratung zum Untersuchungsergebnis
Ab 50 Jahren	M+W	1x im Jahr	Früherkennung Darmkrebs	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm ✓ 50 bis 54 Jahre: jährlicher Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl ✓ Männer: wahlweise auch zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren
Ab 55 Jahren	M+W	Alle 2 Jahre	Früherkennung Darmkrebs	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wahlweise alle zwei Jahre Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl oder zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren
Ab 65 Jahren	Nur M	einmalig	Früherkennung Bauch-aortenaneurysmen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Patientenaufklärung zur Früherkennungsuntersuchung auf Bauchaortenaneurysmen ✓ Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader